

| Обследование женщины | Срок |
|---|-----------------------|
| Анализ крови клинический | 1 мес |
| Анализ крови биохимический: креатинин, билирубин, общий белок, АСТ, АЛТ, мочевины, глюкоза | 1 месяц |
| Общий анализ мочи | 1 месяц |
| Группа крови, резус-фактор | однократно |
| Гемостазиограмма | 1 месяц |
| Анализ крови на гормоны (ФСГ, ЛГ, пролактин, ТТГ, св.Т4, тестостерон, ДГЭА сульфат, 17-ОН прогестерон, АМГ) | 6 месяцев |
| Анализ крови на антитела М и G к ВИЧ 1,2 | 3 месяца |
| Анализ крови на Сифилис (антитела М и G) | 3 месяца |
| Антитела классов IgM+IgG к HB-core антигену вируса гепатита В (anti - HB core total) | 3 месяца |
| Анализ крови на anti-HCV | 3 месяца |
| Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA) (кровь) | 6 месяцев |
| Анализ крови на антитела Ig G и Ig M к краснухе, токсоплазме, ЦМГ, вирус простого герпеса 1,2 | 6 месяцев |
| Мазок из цервикального канала и влагалища | 1 месяц |
| Соскоб на инфекции: хламидии, ВПГ 1и 2 тип, ЦМВ (ПЦР) | 6 месяцев |
| Посев отделяемого цервикального канала на уреоплазму и микоплазму | По показан. |
| Цитологическое исследование шейки матки | 1 год |
| ЭКГ | 1 мес. |
| Флюорография | 1 год |
| Заключение терапевта об отсутствии противопоказаний к ЭКО и вынашиванию беременности | 1 год и по показаниям |
| Заключение маммолога об отсутствии противопоказаний к ЭКО и беременности | 1 год |
| УЗИ молочных желез | 1 год |
| Маммография (женщинам старше 35 лет) | 1 год |
| Обследование мужчины ФИО пациента | |
| Спермограмма | 6 месяцев |
| Анализ крови на антитела М и G к ВИЧ 1,2 | 3 месяца |
| Анализ крови на Сифилис (антитела М и G) | 3 месяца |
| Антитела классов IgM+IgG к HB-core антигену вируса гепатита В (anti - HB core total) | 3 месяца |
| Анализ крови на anti-HCV | 3 месяца |
| Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA) (кровь) | 6 месяцев |
| Микроскопическое исследование уретрального отделяемого (мазок из уретры) | 1 месяц |
| Соскоб из уретры (ПЦР): хламидии, ВПГ 1 и 2 типов, ЦМВ | 6 месяцев |
| Посев отделяемого из уретры на уреоплазму и микоплазму | 6 месяцев |
| Группа крови, резус-фактор | по показан. |
| | |
| | |